INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH

APEL

do hodowców trzody chlewnej

Szanowni Państwo!

Afrykański pomór świń (ASF) – jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki.
Często przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominam o podstawowych zasadach postępowania w celu ustrzeżenia się przed zawleczeniem choroby do swojego gospodarstwa.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz miejscami, w których mogły przebywać dziki,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich w których utrzymywane są świnie.

Niedopuszczalne jest skarmianie świń zielonką bądź używania jako ściółki dla świń tegorocznego siana lub słomy - stanowi to zwiększone ryzyko zakażenia wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Za brak stosowania zasad bioasekuracji grożą konsekwencje karno-administracyjne.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Podejrzewasz ASF zadzwoń!

Pieczątka PIW z numerem telefonu

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SIEDLCACH
UL. KAZIMIERZOWSKA 29
08-110 SIEDLCE
TEL. 25 632 60 27; 25 633 15 98

Inspekcja Weterynaryjna

ASF



Informacja dla hodowców!

Przestrzegaj Następujących Zasad Aby Chronić Gospodarstwo Przed Zawleczeniem Wirusa

- ✓ Kupuj świnie wyłącznie ze znanego źródła.
- ✓ Świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
- ✓ Utrzymuj świnie bez możliwości kontaktu z dzikami.
- ✓ Zabezpiecz pasze i ściółkę przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
- ✓ Wyłóż maty dezynfekcyjne przed wjazdem/wyjazdem z gospodarstwa i przed wejściami do budynków inwentarskich.
- ✓ Nie karm świń odpadkami kuchennymi.
- ✓ Ogranicz do minimum ilość osób mających kontakt ze zwierzętami.
- ✓ Do pracy ze zwierzętami stosuj oddzielny strój i pozostaw go w chlewni.
- ✓ Codziennie obserwuj stan zdrowia świń.

Nie obawiaj się informować o wszelkich niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie.

Pamiętaj: W przypadku stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń i konieczności likwidacji stada, za każde zabite zwierzę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wartości rynkowej.



Objawy mogące wskazywać na wystąpienie ASF

- wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 -42^{0}C. - brak poprawy przy leczeniu antybiotykami;
- UWAGA! gorączkujące świnie mogą mieć zachowany apetyt;
- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała
- wybroczyny w skórze;
- duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa;
- zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego;
- biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
- zwiększone upadki.

Po zaobserwowaniu ww. objawów należy:

- niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii - do czasu jego przybycia pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
- nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu;
- zwłoki padłych zwierząt muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego -zabronione jest grzebanie padłych zwierząt czy wywożenie ich do lasu, gdyż może to spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się epizootii.